

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte Darreichungsform und Stärke von MabThera® auswählen

SUBKUTANE INJEKTION

MabThera 1.600 mg
NUR ZUR ANWENDUNG bei
CLL*



Blauer Flip-off
Deckel

MabThera 1.400 mg
NUR ZUR ANWENDUNG bei
NHL*



Rosa Flip-off Deckel

Direkt aus der Durchstechflasche entnehmen
und als subkutane Injektion verabreichen



Überprüfen Sie vor der Anwendung die für MabThera SC spezifischen
Verpackungscharakteristika:

Rote Beschriftung: 'Nur zur subkutanen Anwendung', 'Lösung zur
subkutanen Injektion' und 'subkutan'

INTRAVENÖSE INFUSION

MabThera 100 mg Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
MabThera 500 mg Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Zur Anwendung bei allen für MabThera zugelassenen Indikationen*



Mit 0,9%iger NaCl- oder 5%iger
Glukose-Lösung verdünnen und als
intravenöse Infusion verabreichen



Veröffentlicht von
Roche Austria GmbH
1121 Wien

© 2017

Alle verwendeten Handelsnamen sind rechtlich geschützt.
www.rochescience.at


Stand der Information: Oktober 2017
AT Version 2.2 (RMP V15)

CLL = Chronische Lymphatische Leukämie; NHL = Non-Hodgkin-Lymphom.

* Beachten Sie bitte für weitere Informationen die Fachinformation von MabThera oder kontaktieren Sie den zuständigen Roche Austria Außendienstmitarbeiter.

Verwenden Sie das Abziehklebeetikett wie unten illustriert, um zu gewährleisten, dass dem Patienten die korrekte Darreichungsform und Stärke verabreicht wird

**MabThera 1.600 mg Lösung zur subkutanen Injektion
NUR ZUR ANWENDUNG bei CLL**



1. Auf der MabThera 1.600 mg Durchstechflasche befindet sich ein abziehbares Klebeetikett

2. Ziehen Sie das Klebeetikett ab

3. Kleben Sie das Klebeetikett auf die Spritze

**MabThera 1.400 mg Lösung zur subkutanen Injektion
NUR ZUR ANWENDUNG bei NHL**



1. Auf der MabThera 1.400 mg Durchstechflasche befindet sich ein abziehbares Klebeetikett

2. Ziehen Sie das Klebeetikett ab

3. Kleben Sie das Klebeetikett auf die Spritze