



# Erivedge® Schwangerschafts- Verhütungsprogramm

---

Informationen für Ärzte, die Erivedge® verschreiben

# Leitfaden zum Schwangerschaftsverhütungs-Programm

## Weibliche Patienten im gebärfähigen Alter:

- müssen monatliche Schwangerschaftstests machen, auch wenn sie amenorrhöisch werden.
- müssen während der Einnahme und noch 24 Monate nach Erhalt der letzten Dosis von Erivedge® zwei der empfohlenen Verhütungsmethoden anwenden.
- dürfen während ihrer Behandlung und noch 24 Monate nach Erhalt der letzten Dosis nicht stillen.

## Männliche Patienten:

- müssen Kondome benutzen (wenn verfügbar, mit Spermiziden), wenn sie während der Einnahme und noch 2 Monate nach ihrer letzten Dosis von Erivedge® Geschlechtsverkehr mit einer Frau haben.
- dürfen während der Behandlung und noch 2 Monate nach der letzten Dosis dieses Arzneimittels keine Samen spenden.

Die Patientin/der Patient muss Sie sofort kontaktieren, wenn sie/seine Geschlechtspartnerin vermutet schwanger zu sein.

Sie müssen

- den Schwangerschaftsstatus überprüfen, den Patienten zu teratogenen Risiken beraten und den Patienten und seine Geschlechtspartnerin an einen spezialisierten Arzt überweisen.
- alle bestätigten Schwangerschaften an Roche melden.
- alle erforderlichen Informationen in das Webportal zum Erivedge® Schwangerschaftsverhütungs-Programm eingeben ([www.erivedge-ppp.at](http://www.erivedge-ppp.at)).

**Benutzername:** erivedge\_AT

**Passwort:** erivedge

## Alle Patienten:

- dürfen dieses Arzneimittel niemals an andere Personen weitergeben.
- müssen nicht verwendete Kapseln am Ende der Behandlung zurückbringen (die Beseitigung erfolgt gemäß den nationalen Anforderungen).
- dürfen während der Behandlung mit Erivedge® und noch 24 Monate nach der letzten Dosis von Erivedge® kein Blut spenden.

Weitere Informationen zu den Nebenwirkungen von Erivedge® und zu Schwangerschaftsverhütung können in der Fach- und Gebrauchsinformation von Erivedge® nachgelesen werden.

Roche Austria GmbH  
1211 Wien, Engelhorngasse 3  
Tel.: +43 277 39 0  
E-Mail: [austria.drug\\_safety@roche.com](mailto:austria.drug_safety@roche.com)