

# Erivedge® Patientenkarte

---

Stand der Information: April 2019

Erivedge® kann Ihr ungeborenes Kind schädigen oder zu dessen Tod führen.

### **Weibliche Patienten, die schwanger werden können, müssen:**

- während der Behandlung und noch 24 Monate nach ihrer letzten Dosis immer **zwei** der empfohlenen Verhütungsmethoden anwenden (für weitere Informationen beachten Sie bitte die Broschüre „Erivedge® Schwangerschaftsverhütungs-Programm: Informationen für Patienten, die Erivedge® einnehmen“)
- monatliche Schwangerschaftstests durchführen, um ihren Schwangerschaftsstatus zu überwachen.

### **Männliche Patienten:**

- müssen während der Behandlung und noch für 2 Monate nach ihrer letzten Dosis immer ein Kondom (wenn verfügbar, mit Spermiziden) benutzen, wenn sie Geschlechtsverkehr mit einer Frau haben.
- dürfen während der Behandlung und für 2 Monate nach der letzten Dosis dieses Arzneimittels keinen Samen spenden.

Sie müssen sofort Ihren Arzt informieren, wenn bei Ihnen oder Ihrer Geschlechtspartnerin eine Menstruation ausfällt, Sie oder Ihre Partnerin eine Schwangerschaft vermuten oder eine Schwangerschaft eingetreten ist.

- Weibliche Patienten: Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie während der Einnahme und noch 24 Monate nach Ihrer letzten Dosis von Erivedge® eine Schwangerschaft vermuten.
- Männliche Patienten: Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Ihre Geschlechtspartnerin während Sie Erivedge® einnehmen und noch 2 Monate nach Ihrer letzten Dosis eine Schwangerschaft vermutet.

Alle Patienten:

Geben Sie dieses Arzneimittel niemals an andere Personen weiter.

Sie dürfen während der ganzen Behandlungszeit und noch für 24 Monate nach der letzten Dosis dieses Arzneimittels kein Blut spenden. Bringen Sie nicht verwendete Kapseln am Ende der Behandlung zurück.

# Telefonnummern für den Notfall

---

Name .....

Tel.-Nr. ....

Stand der Information: April 2019